

Uebersicht der mir bekannten *Pedius*-Arten.

Von Edm. Reitter in Mödling.

- 1'' Halsschild nur mit einem Basalstriche. Flügeldecken ohne Scutellarstreifen. Basalglieder der Fühler einfach. *)
- 2'' Grösser; nur die Basalstriche des Halsschildes und manchmal deren Nähe punktirt. *inquinatus* Strm.
- 2' Klein; die ganze Basis des Halsschildes punktirt. *inaequalis* Mrsh.
- 1' Halsschild jederseits mit 2 Basalstrichen, der äussere ist kürzer. Flügeldecken mit einem Scutellarstreifen. Die Basalglieder der Fühler etwas gekielt. *Poecilus*-artige.
- 3' Letztes Glied der Tarsen auf der Unterseite mit 2 Borstenhaarreihen besetzt.
- 4'' Scheitel glatt, Kopf hinter den kleinen, kaum vorstehenden Augen allmählig verengt, Hals lang. *coarctatus* Luc.
- 4'' Scheitel fein punktirt, Kopf hinter den grossen, stark vortretenden Augen sogleich stark verengt, Hals kurz. *decipiens* Walk.
- 3' Letztes Glied der Tarsen auf der Unterseite kahl.
- 5'' Flügeldecken furchenartig gestreift, die Streifen mit grossen Kerbpunkten, Zwischenräume etwas gewölbt, am dritten ohne deutliche Dorsalpunkte.
- 6'' Halsschild nur an der Basis mit einzelnen Punkten. *crenatus* Dej.
- 6' Die ganze Oberseite des Halsschildes punktirt. *sculpticollis* n. sp.
- 5' Flügeldecken mässig gestreift, die Streifen feiner punktirt, schwach gekerbt, Zwischenräume flach, der dritte hinten mit 2 deutlichen Dorsalpunkten.
- 7'' Braunschwarz, unten rothbraun, Fühler und Beine braunroth, Basis des Halsschildes nur mit einzelnen groben Punkten. *planidorsis* n. sp.
- 7' Breiter, weniger parallel, grün oder blau, unten schwarz, Fühler, Palpen und Beine schwarz, Fühler gegen die Spitze etwas heller werdend, die Basis und die hintere Mitte des Halsschildes punktirt. *tauricus* Heyd.

*) In diese Gruppe gehört noch der mir unbekannte *P. siculus* Levrat.

Pedius sculpticollis n. sp. *Elongatus, subparallelus, niger, nitidus, antennis, palpis pedibusque obscure brunneis, tarsis dilutioribus, antennarum articulis primis tribus basi compressis; capite parvo, punctato, collo brevi, constricto, prothorace latitudine vix aut minus brevior, cordato, ante medium rotundato, ante angulos posticos rectos valde sinuato, supra sparsius punctato, impressionibus basalibus duabus utrinque, lineaque medio profundis; elytris elongatis, subparallelis, thorace vix aut minus latioribus, profunde striatis, striis fortiter crenato-punctatis, interstitiis convexiusculis, interstitio tertio punctis dorsalibus haud impressis; subtus dense punctatus, tarsorum articulo ultimo subtus glabro.* Long. 11—13 mm.

Dem *P. crenatus* ähnlich, aber der Halsschild ist auf der ganzen Scheibe punktiert, Körper flacher, mehr braunschwarz, Flügeldecken flacher etc.

Syrien, Armenien, Talysch.

Pedius planidorsis n. sp. *Elongatus, subparallelus, nigropiceus, nitidus, subtus cum pedibus antennisque ferrugineis, capite parvo, laevi, collo brevi, leviter constricto; prothorace coleopteris parum angustiore, longitudine vix latiore, subcordato, laevi, striolis utrinque et basi in medio parce punctatis, lateribus antice rotundatis, basin versus sensim angustatis, angulis posticis parvulis, rectis; elytris elongatis, subparallelis, striatis, striis mediocribus haud fortiter punctatis, interstitiis planis, interstitio tertio postice bipunctato; subtus punctatus, prosterno in medio laevi, tarsorum articulo ultimo subtus glabro.* Long. 14 mm.

Ich habe diese schwarzbraune Art ursprünglich für *baeticus* halten wollen, den man wohl mit Recht zu *crenatus* zieht; aber der letztere ist nach der Beschreibung kürzer als *crenatus*, an den Seiten gerundeter, Fühler und Beine schwarz etc. Bei *planidorsis* trifft das Gegenteil zu: er ist grösser, länger, paralleler, flacher, Fühler und Beine sind, wie die ganze Unterseite, hell rostroth gefärbt etc.

Andalusien.